

ksv/6

SANTIAGO, 8 MAR 1985

SEÑOR JUEZ:

Con fecha 27-2-85, practiqué en este Instituto, la autopsia de CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN, enviado por la Fiscalía Ejercito y Carabineros Valparaíso, con Oficio 95; con antecedentes de haber sufrido un accidente en Comisaría Quintero.

Es ingresado desnudo a la sala de necropsias.
Sus ropas sobrepuestas, manchadas con tierra.
Ropas: 1 blue jeans, 1 camisa listada beige, calzoncillo celeste, zapatillas deportivas café.
Estatura 175 cm. y Peso 65 kg.
Edad 23 años.

Inspección general externa

Ectomorfo.

Livideces rosadas fijas en planos posteriores del cuerpo.

Rigidez cadavérica generalizada, más acentuada en las extremidades inferiores.

Incisión de necropsia de 37 cm. que se extiende desde el mango del esternón hasta el ombligo, suturada con cañamo.

2 escoriaciones de 15x12 mm. y 3 mm. dorso de la nariz en su base.

Zona erosiva de 10x5 mm. surco naso labial, lado derecho.

Zona erosiva de 8 mm. de diámetro, a nivel del tabique nasal.

Herida contusa superficial de 2 mm. región retroauricular derecha, a nivel del lóbulo, con infiltración sanguínea rojo oscura, del tejido celular subcutáneo.

Zona escoriativa de 3 mm., cara posterior, oreja derecha.

Cianosis de los lechos ungueales de las manos.

Incisión de necropsia del cuero cabelludo, bimastoidea suturada con cañamo.



[Handwritten signature]

Recibido 4 marzo 1985

1/2
12

A nivel del saco escrotal, cara anterior, lado izquierdo, existe una zona congestiva, vascularizada de 4x2,5 cm. y con un tinte amarillento central.

En el pie derecho, cara superior, 1/3 medio, existe una lesión verrugosa café, de 8 mm. de diámetro.

Herida contusa, antigua, en vías de cicatrización, de 3 mm. dedo pulgar derecho, cara anterior (pulpejo).

Erosión de 2 mm. de diámetro, codo izquierdo.

Se realizan cortes en el tórax posterior, paredes posteriores del abdomen, regiones glúteas y cara posterior de los muslos y piernas, registrándose lo siguiente:

Infiltración sanguínea rojo oscura de 7x2 cm. región interescapular.

Infiltración sanguínea rojo oscura, de 3x1,5 cm. región lumbar derecha.

Infiltración sanguínea violáceo rojiza oscura de 4x3,5 cm., a nivel del sacro.

Coloración verdosa del abdomen por putrefacción.

Placa apergaminada de 5,5x3 cm. región esternal media. Numerosas erosiones lineales semi-circulares en el tórax anterior, 2/3 superiores, a nivel esternal. Mayor 15 mm. Menor 5 mm.

Examen Interno

Cabeza

Cuero cabelludo: Cara interna, sin lesiones. Se registra infiltración sanguínea rojo oscura de 5x3 cm. de la aponeurosis epicraneal, a nivel del parietal izquierdo, 1/3 medio. Músculos temporales sin lesiones.

Cráneo: Exhibe corte irregular de sierra de la 1ª autopsia, a nivel de la bóveda, que compromete la porción vertical del frontal y ambos parietales hasta su 1/3 medio, constatándose sección irregular post mortem de ambos parietales en su 1/3 posterior y diástasis parcial de la sutura sagital en su 1/3 posterior. Grosor máximo 7 mm. occipital izquierdo. Grosor mínimo 3 mm., frontal izquierdo. Sin fracturas.

Encéfalo: 1570 g. Se encuentra in Situ, no ha sido extraído.

Cerebro: Tamaño normal. Simétrico. Circunvoluciones discretamente aplanadas y ensanchadas, surcos estrechos. Parénquima con marcada cianosis, reblandecido discretamente.



Alvarado y...

En los cortes no se registran contusiones ni hemorragias.

Cerebelo: Existe protrusión de las amígdalas cerebelosas en el agujero occipital. Sin lesiones.

Tronco encefálico: Discretamente reblandecido. Sin lesiones.

Arterias de la base: Sin patologías.

Organos del cuello: Ocupan su lugar habitual. No han sido extraídos, pálidos, con secreción mucosa amarillenta.

Tórax: Se amplia la 1a. incisión de necropsia, procediéndose a efectuar las incisiones cutáneas y disección de la musculatura torácica, registrándose lo siguiente: Infiltración sanguínea extensa rojo oscura de 20x4 cm. del tejido celular subcutáneo, que compromete las regiones supraclavicular, clavicular y tórax anterior, 1/3 superior derechos.

Infiltración sanguínea rojo oscura en el hueco supraesternal de 6x5 cm., que compromete los músculos infrahioideos bilaterales, en su inserción inferior.

Infiltración sanguínea rojo oscura de 16x4 cm. del tejido celular subcutáneo, que compromete las regiones supraclavicular, clavicular, y torax anterior, 1/3 superior izquierdos, el músculo pectoral mayor de ese lado con zonas hemorrágicas.

Se ha extraído el peto esternal costal, sin desarticular las clavículas, provocando la fractura del esternón a nivel del mango.

Tórax: sin fracturas.

Cavidad torácica: Se han extraído el pulmón izquierdo y corazón, los cuales exhiben cortes de disección, el último con cortes incompletos, faltando el corte de las cavidades izquierdas y disección de las coronarias.

Tráquea Bronquios: Con abundante secreción. Mucosa amarillenta. Mucosa congestiva.

Esófago: Mucosa con discreta cianosis. Sin lesiones.

Pulmones: Izquierdo 330 g. Exhibe numerosas petequias y hemorragias subpleurales difusas. Pálido.

Derecho 405 g. Exhibe petequias y hemorragias subpleurales, escasas, difusas. Pálido.

Vasos pulmonares sin alteraciones.

Corazón: 310 g. Hay petequias subepicárdicas finas.

Ventrículo izquierdo 15 mm.

Ventrículo derecho 4 mm.

[Handwritten signature]



Monsieur Guaita 94

Los músculos papilares con discreta hipertrofia. La aurícula izquierda exhibe una zona trabeculada de 3x2 cm. Válvulas mitral 10 cm. Aortica 6,5 cm. Tri-cuspide 11,5 cm. Pulmonar 7 cm. La válvula mitral con sus velos discretamente engrosados. Miocardio pálido. Coronarias permeables, sin patología. Aorta con manchas de lipoide.

Cavidad abdominal: Se ha extraído el bazo, que muestra un corte transversal y se ha abierto parcialmente el estómago a nivel del antro en su curvatura mayor, en una extensión de 7 cm. El resto de los órganos, ocupan su lugar habitual.

Existe infiltración sanguínea rojo oscura de 6x3 cm. del músculo recto mayor derecho del abdomen, a nivel del hipocondrio derecho, cercano al epigastrio, por debajo del reborde costal.

Hígado: 1.380 g. Tamaño normal, superficie lisa. Exhibe pequeña laceración en la cara superior del lóbulo derecho, sin infiltración sanguínea (post mortem) Parénquima cianótico y congestivo.

Vias biliares y colecisto: Sin alteraciones.

Estómago: Con algunas mucosidades amarillentas escasas. Mucosa aplanada, con algunas petequias a nivel del antro.

Intestinos: Delgado, con material líquido espeso café verdoso. Mucosa autolítica, con imbibición hemoglobínica. Colon con deposiciones semi-disgregadas de color verdoso amarillo. Mucosa sin lesiones.

Bazo: 160 g. Cianótico, congestivo. Sin lesiones.

Suprarrenales: Tamaño normal, autolíticas.

Páncreas: Tamaño normal, violáceo, con imbibición hemoglobínica. Sin lesiones.

Riñones: Derecho 140 g. Izquierdo 160 g. superficie lisa, cianóticos, congestivos. Sin lesiones.

Vejiga: Con 500 ml. de orina clara. Mucosa con algunas petequias. Sin lesiones.

Próstata: Sin alteraciones.

Uretra: Sin alteraciones.

Genitales: Masculinos, con la alteración del escroto ya descrita.

Ano: Dilatado, de pliegues borrados.

Nota: Se extrae sangre de las venas ilíacas primitivas para examen de Grupo y Alcoholemia.

